

Belangrijke Richtlijnen na uw Cataractingreep

1. Pijnstilling

Ongeveer 1 uur na de ingreep raakt de verdoving uitgewerkt. Een lichte pijnstiller (zoals DAFALGAN of PERDOLAN MONO) helpt gewoonlijk voldoende.

2. Verband

U laat het verband ter plaatse tot de dag na de ingreep, dan mag U het 's morgens voorzichtig verwijderen.

3. Medicatie

U kan de dag na de operatie beginnen te druppelen. Beide flesjes mogen gedruppeld worden met telkens minstens 10 minuten ertussen. Gelieve onderstaand schema te volgen.

	Tobradex	Indocollyre
1^e week	4x per dag 1 druppel	3 x per dag 1 druppel
2^e week	3x per dag 1 druppel	3x per dag 1 druppel
3^e week	2x per dag 1 druppel	3x per dag 1 druppel
4^e week	1x per dag 1 druppel	3x per dag 1 druppel

4. De oogschelp

De oogschelp draagt u gedurende 1 week 's nachts. Dit is om uw oog te beschermen.

5. De eerste 3 weken na de ingreep

Uw oog kan rood zijn, tranen of pikken en het zicht kan nog wazig zijn. Meestal zijn deze klachten na één week voorbij.

- U mag niet hevig in uw oog wrijven of erop duwen.
- U mag geen zware gewichten heffen of hevige sportinspanningen leveren.
- U mag niet zwemmen.
- U mag geen oogmake-up gebruiken.
- U dient voorzichtig te zijn met het besturen van een wagen.
- U mag wel douchen en uw haar wassen, maar met gesloten ogen.

Indien uw zicht plots slechter wordt of wanneer het geopereerde oog erg rood wordt, traant en pijn doet, moet U snel contact opnemen met uw oogarts. Mogelijk is er een infectie opgetreden.

Heeft U nog vragen? Aarzel niet om ons dan verder te contacteren:

- Imelda Ziekenhuis: 015/50.51.11
- Praktijk Putte: 015/76.09.70